

Pflanzlisten

Grundyp 3 - Block-/Driftpflanzung

Block-/Driftpflanzung sonnig bis absonnig Gelb - Violett

Kürzel	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Stück/m²	Höhe in cm	Blütezeit	Licht	Bodenfeuchte	Sonstiges
AdPK	Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'	Kissen-Aster	P9	11 St.	30	IX-X	O	~	B
CBC	Calamintha nepeta ssp nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze	P9	6 St.	40-60	VI-VIII+IX	O Ø ⊕	—	h B
HM	Hemerocallis 'Maikönigin'	Taglilie	P1	6 St.	50-60	V-VI	O Ø	~	
NrS	Nepeta racemosa 'Superba'	Katzenminze	P9	8 St.	30-40	IV-VII+IX	O Ø	—	B
RfLG	Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar'	Gelber Sonnenhut	P9	8 St.	45	VII-X	O	~ ≈	B
Sa	Sesleria autumnalis	Herbst-Kopfgras	P1	11 St.	30/50	VIII-X	O Ø ⊕	— ~	

Erläuterungen:
Die Block-/ Driftpflanzung setzt sich - je nach Beetgröße und Standort - aus wenigen Arten zusammen zusammen.
Bei größeren Beetflächen können weitere Arten hinzugenommen werden.
In Abhängigkeit des Standorts, der Beetgröße und der Funktion der Pflanzung können andere Arten an Ziergräsern (siehe Liste Seite 71), Blütenstauden (siehe Listen Seiten 72-74) oder auch Sträuchern (siehe Liste Seite 76) verwendet werden. Entweder wird die Mischung mit weiteren Arten ergänzt oder Arten ausgetauscht.
Blumenzwiebeln:
Die Matrixpflanzung wird mit der Blumenzwiebelmischung von Seite 69 ergänzt.

Legende

Licht

- O sonnig
- Ø absonnig
- ⊕ halbschattig
- schattig

Bodenfeuchte

- trocken
- ~ frisch
- ≈ feucht

Liefer- bzw. Pflanzqualität

- P1 Topfballen mit 1 Liter
- P9 Topfballen mit 0,5 Liter

Sonstiges

- h heimische Art
- B Bienenweidepflanze



Aster dumosus
'Prof. Anton Kippenberg'
Kissen-Aster



Calamintha nepeta ssp.
nepeta 'Blue Cloud'
Bergminze



Hemerocallis
'Maikönigin'
Taglilie



Nepeta racemosa
'Superba'
Katzenminze



Rudbeckia fulgida
'Little Goldstar'
Gelber Sonnenhut



Sesleria autumnalis
Herbst-Kopfgras