

Pflanzlisten

Grundyp 3 - Block-/Driftpflanzung

Block-/Driftpflanzung absonnig bis halbschattig unter Bäumen Violett - Weiß - Creme

Kürzel	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Stück/m²	Höhe in cm	Blütezeit	Licht	Bodenfeuchte	Sonstiges
AdT	Aster divaricatus 'Tradescant'	Wald-Aster	P9	3 St.	30-50	VIII-IX	O ∅ ⊕	– ~	B
CBC	Calamintha nepeta ssp nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze	P9	6 St.	40-60	VI-VIII+IX	O ∅ ⊕	–	h B
GhG	Geranium himalayense 'Gravetye'	Himalaya-Storchschnabel	P9	8 St.	30-40	V-VII	O ∅ ⊕	~	B
HvM	Heuchera villosa 'Macrorrhiza'	Purpurglöckchen	P9	9 St.	40-60	IX-XI	O ∅ ⊕	~	
Sa	Sesleria autumnalis	Herbst-Kopfgras	P1	11 St.	30/50	VIII-X	O ∅ ⊕	– ~	
Sg	Symphytum grandiflorum	Kaukasus-Beinwell	P9	11 St.	20-30	IV-V	O ∅ ⊕	~	B

Erläuterungen:
Die Block-/ Driftpflanzung setzt sich - je nach Beetgröße und Standort - aus wenigen Arten zusammen zusammen.
Bei größeren Beetflächen können weitere Arten hinzugenommen werden.
In Abhängigkeit des Standorts, der Beetgröße und der Funktion der Pflanzung können andere Arten an Ziergräsern (siehe Liste Seite 71), Blütenstauden (siehe Listen Seiten 72-74) oder auch Sträuchern (siehe Liste Seite 76) verwendet werden. Entweder wird die Mischung mit weiteren Arten ergänzt oder Arten ausgetauscht.
Blumenzwiebeln:
Die Matrixpflanzung wird mit der Blumenzwiebelmischung von Seite 70 ergänzt.

Legende
Licht
O sonnig
∅ absonnig
⊕ halbschattig
• schattig

Bodenfeuchte
– trocken
~ frisch
≈ feucht

Liefer- bzw. Pflanzqualität
P1 Topfballen mit 1 Liter
P9 Topfballen mit 0,5 Liter

Sonstiges
h heimische Art
B Bienenweidepflanze



Aster dumosus
'Prof. Anton Kippenberg'
Kissen-Aster



Calamintha nepeta ssp.
nepeta 'Blue Cloud'
Bergminze



Geranium himalayense
'Gravetye'
Himalaya-Storchschnabel



Heuchera villosa
'Macrorrhiza'
Purpurglöckchen



Sesleria autumnalis
Herbst-Kopfgras



Symphytum grandiflorum
Kaukasus-Beinwell